


Jak dávkovat Voltaren Forte?

Podle velikosti bolestivého místa, které má být ošetřené, se aplikuje **2 g až 4 g gelu**.

(množství odpovídající velikosti **třešně až vlašského ořechu**)

PŘEPOČET DÁVKY:



Třešeň*

- při pouřazovém poranění měkkých tkání: šlachy, vazy, svaly, klouby (rameno, kotník, menší klouby rukou)

* přibližně 400 cm²

Vlašský ořech**

- při pouřazovém poranění kolene
- bolestivá záda

**přibližně 800 cm²
A4 = 624 cm²

Nanášejte Voltaren Forte 2krát denně (ráno a večer) na bolestivou oblast. Voltaren Forte poskytuje dlouhotrvající úlevu od bolesti až na 12 hodin.

- Jemně vtírejte malé množství přípravku Voltaren Forte do pokožky v místě bolesti nebo otoku.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Voltaren Forte 20 mg/g gel je lék k použití na kůži. Obsahuje diclofenacum diethylaminum. V případě otázek kontaktujte prosím: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, e-mail: cz.info@gsk.com. Případné nežádoucí účinky prosím hláste na: cz.safety@gsk.com. Ochranné známky jsou vlastněné nebo licencované skupinou společností GSK. ©2022 skupina společností GSK nebo poskytovatel příslušné licence.

Datum vytvoření materiálu: 03/2022

PM-CZ-VOLT-22-00017