

Sensibilité Dentaire ? Vous n'êtes pas seul

Jusqu'à 1 patient sur 2 souffre d'hypersensibilité dentinaire¹



1. Qu'est ce qu'est la sensibilité dentaire ?

La sensibilité dentaire (ou hypersensibilité dentinaire) est souvent décrite comme une douleur transitoire, courte, aiguë, et soudaine déclenchée par un stimulus. La sensibilité dentaire se développe lorsque la couche intérieure de vos dents (appelée dentine) est exposée et n'est plus protégée par l'émail ou les gencives.

2. Quelles sont les causes de la sensibilité dentaire

- Les principales causes de la sensibilité dentaire sont :
- La récession gingivale due à l'âge ou à un brossage trop agressif
 - Les boissons acides qui provoquent l'érosion de l'émail
 - Le bruxisme (grincement des dents)
 - Le brossage des dents avec un dentifrice abrasif et/ou plus de trois fois par jour
 - Certains traitements dentaires (blanchiment des dents, le port d'un appareil orthodontique etc...)

Déclencheurs de la douleur³



3. Comment prendre soin de vos dents ?

- Remplacer le dentifrice classique par un dentifrice spécialement conçu pour soulager la sensibilité dentaire
- Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire
- Utiliser une brosse à dents avec filaments souples
- Ne pas brosser trop fort

SOULAGEMENT IMMEDIAT



Sensodyne Rapide Action procure un soulagement instantané **en 60 secondes** et une **protection durable*** contre la sensibilité

SOULAGEMENT DURABLE



Sensodyne Répare & Protège forme une couche protectrice recouvrant la dentine exposée et procure une protection de longue durée contre l'hypersensibilité dentinaire*

Si la douleur persiste, contactez votre dentiste.

LA VIE EST TROP COURTE POUR AVOIR LES DENTS SENSIBLES

La gamme de dentifrices SENSODYNE contient des dispositifs médicaux (Sensodyne Rapide Action, Sensodyne Répare & Protège), produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Haleon Medical Devices. Lire attentivement les instructions figurant sur l'emballage. Ne pas utiliser chez l'enfant. Demandez conseil à votre dentiste ou votre pharmacien. Haleon France – RCS Nanterre 672 012 580. © 2024 Groupe Haleon PM-FR-SENSO-24-00033-02

1. West N. et al Dentine hypersensitivity and associated risk factors : An observational, cross-sectional multi-centre epidemiological study in 7 European countries (Meribel), IADR Bogota, 2023.

2. Addy, M (2002) "Dentine hypersensitivity : new perspective on an old problem", International Dental Journal, 52 (S5P2), pp. 367-375.

3. Boiko O, Baker SR, Giboso BS, Cocker D, Sufi F, Barlow APS, Robinson PG (2010) Construction and validation of the quality of life measure for dentine hypersensitivity (DHEQ), J Clin Periodontol pp. 973-980.

*Avec un brossage 2 fois par jour.