


8 주 시험: 상아질지각과민증 1,2

63% 더 효과적인 시린이 완화효과 2*

베이스라인부터 8 주차까지 상아질지각과민증(Schiff 점수)의 변화 2



1. Parkinson CR et al; Am J Dent; 26 (Spec Iss): 25A-31A; 2013 (Mar)
 2. Parkinson CR et al; Am J Dent; 28(4): 190-196; 2015

6 개월 장기 시험: DHEQ 1,2

5개 영역 포함 설문지



1. GSK Data on File; study 204930; 2017
 2. Mason et al. BMC Oral Health; 19:226; 2019

6개월 장기 실험: DHEQ^{1,2}



1. GSK Data on File; study 204930 (2017).

2. Mason et al. BMC Oral Health (2019) 19:226

통계적으로 유의한 개선

0.454% 플루오르화석을 함유한 민감성치아 전용 치약의 장기(24 주)사용은 구강건강 관련 삶의 질(oral-health-related quality of life, OHRQOL)에서 통계적으로 유의한 개선을 입증했습니다. 이는 제품을 1 일 2 회 8 주간 사용 후 총 DHEQ 점수가 완화된 것으로 증명되었습니다.

또한 다음과 같이 OHRQOL 의 각 영역이 통계적으로 유의하게 개선된 것으로도 증명되었습니다.

- 4 주차부터제한및정서영역
- 8 주차부터적응및사회영역
- 12 주차부터주체성영역

1. GSK Data on File; study 204930 (2017).

2. Mason et al. BMC Oral Health (2019) 19:226

상아질 지각과민증 관리를 위한 연구

센소다인 리페어 & 프로텍트 치약의 플루오르화석 성분이 노출된 상아세관의 미세한 틈새에 깊게 침투하여, 민감한 치아 부위에 보호층을 형성함으로써 시린 증상을 완화해줍니다.

- 상아질 지각과민증은 환자들의 구강건강 관련 삶의 질뿐만 아니라 일상 속 다양한 측면에 큰 영향을 줄 수 있습니다.^{1,2}
- 플루오르화석 치약을 사용한 1 일 2 회 칫솔질은 상아질 지각과민증 완화를 입증했습니다.²⁻⁴
- 플루오르화석을 함유한 민감성치아 전용 치약의 장기간 사용은 구강건강 관련 삶의 질을 유의하게 개선할 수 있습니다.²
- DHEQ 를 치과 진료에 사용하여 상아질 지각과민증과 관련된 환자 구강건강 관련 QoL(삶의질)을 평가할 수 있습니다.
- 민감성치아 전용 치약의 1 일 2 회 장기간 사용을 권장하여 구강건강관련 QoL(삶의질) 매개 변수의 측면에서 임상적 그리고 장기적으로 상아질 지각과민증 환자에게 유의한 영향을 줄 수 있습니다.

1. Baker S et al; J Clin Periodontol; 41: 52-59 (2014).

2. Mason et al. BMC Oral Health (2019) 19:226

3. Parkinson CR et al; Am J Dent;26 (Spec Iss):25A-31A; 2013 (Mar)

4. Parkinson CR et al; Am J Dent; 28(4): 190-196; 2015